



Nimenrix^{MD}



Message destiné aux

ADOLESCENTS ET AUX VOYAGEURS

Êtes-vous protégé contre la
méningite méningococcique?



Vous allez étudier
dans un collège?
Vous planifiez un voyage?

**Soyez proactif : demandez à votre
médecin de vous parler de Nimenrix^{MD}**

Comme n'importe quel autre vaccin, Nimenrix pourrait ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes qui ont été vaccinées. Nimenrix ne protégera que contre les infections causées par les types de *Neisseria meningitidis* compris dans ce vaccin.




LES ADOLESCENTS

de 15 à 19 ans présentent l'un des taux les plus élevés de signalement de méningococcie invasive au Canada

Adolescents canadiens

Après les enfants de moins de 1 an, les adolescents de 15 à 19 ans font partie du groupe d'âge pour qui le taux de cas de méningococcie invasive signalés est le plus élevé.

Taux de cas de méningococcie invasive signalés pour chaque tranche de 100 000 personnes, par groupe d'âge, entre 2013 et 2017



D'après l'Agence de la santé publique du Canada.

Aux adolescents qui fréquentent des endroits bondés

La méningite méningococcique est apparue traditionnellement :

- Dans des écoles
- Dans des collèges
- Dans d'autres endroits où étaient regroupés de grands nombres d'adolescents et de jeunes adultes

Tu es un ado qui fréquentera bientôt un collège ou une université?

Demande à ton médecin de te parler de Nimenrix avant de partir!

ET LES VOYAGEURS

qui se rendent là où la méningite méningococcique est plus fréquente courent un risque plus élevé de contracter la maladie



Aux voyageurs qui se rendent en Afrique subsaharienne

Il est recommandé de recevoir un vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque tel que Nimenrix avant de se rendre dans un pays compris dans la région appelée « la ceinture de méningite », qui s'étend d'ouest en est du Sénégal à l'Éthiopie.

Pour obtenir leur visa, **tous les participants au Hadj ou à la Oumra** doivent obligatoirement avoir un certificat de vaccination contre la méningite à méningocoques.

Aux voyageurs qui ont des problèmes de santé

Vous courez un plus grand risque de méningococcie invasive si l'une des situations suivantes s'applique à vous :

- Absence de fonctionnement de la rate
- Infection par le VIH (en particulier si elle était présente à la naissance)
- Grippe récente
- Infection respiratoire concomitante
- Déficit en anticorps primaires
- Déficit en complément
- Implants cochléaires
- Certains facteurs de risque génétiques
- Tabagisme actif ou passif

Planifiez-vous un voyage?

Demandez à votre médecin de vous parler de Nimenrix avant de partir!



Recommandations du CCNI et du CCMTMV en matière de vaccination contre le méningocoque*

LES ADOLESCENTS

devraient recevoir une dose de rappel à la suite de la vaccination initiale contre le sérotype C, à savoir un vaccin contre le sérotype C ou un vaccin quadrivalent (pour contribuer à la protection contre les sérotypes A, C, W₁₃₅ et Y) environ à l'âge de 12 ans (selon la province où ils habitent).

LES VOYAGEURS

(enfants et adultes) qui sont exposés à un risque plus élevé de méningite méningococcique en raison de problèmes de santé devraient être vaccinés contre les sérotypes A, C, W₁₃₅ et Y, peu importe leur destination.

Le CCNI recommande l'administration d'une dose de rappel d'un vaccin antiméningococcique quadrivalent tel que Nimenrix tous les 3 à 5 ans*† pour les personnes qui présentent un risque élevé de méningococcie invasive en raison de problèmes de santé ou qui courent un risque continu d'exposition.

Certains pays exigent que les visiteurs aient été vaccinés contre la méningite méningococcique avant leur arrivée.

Demandez à votre médecin de vous indiquer quelles sont les exigences du pays de votre destination et si votre calendrier de vaccination doit être modifié pour que vous receviez des doses plus fréquentes.

Couverture offerte par divers vaccins

Couverture des sérotypes	Nimenrix	Vaccin conjugué contre le méningocoque de type C	Vaccin contre le méningocoque du groupe B
A	✓		
C	✓	●	
W₁₃₅	✓		
Y	✓		
B			●

Bien qu'il soit impossible d'empêcher les microbes de se répandre, la VACCINATION est la meilleure façon de prévenir la méningite méningococcique.

CCNI : Comité consultatif national de l'immunisation
CCMTMV : Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages
* Veuillez consulter les lignes directrices pour connaître l'ensemble de l'information et des recommandations.
† Selon l'âge auquel la personne a reçu la dose initiale.

Qu'est-ce que la méningococcie invasive?

C'est une infection sérieuse causée par une bactérie (*Neisseria meningitidis*), qui peut entraîner des maladies sérieuses et parfois mortelles comme :

- la méningite (infection de l'enveloppe du cerveau)
- la septicémie (infection du sang)

SYMPTÔMES POSSIBLES DE MÉNINGITE :

- Maux de tête intenses
- Fièvre
- Nausées et vomissements
- Sensibilité à la lumière
- Raideur de la nuque

SEPTICÉMIE :

- Saignement sous la peau
- Défaillance de plusieurs organes

CONSÉQUENCES POSSIBLES :

- Mort (dans 5 à 10 % des cas environ)
- Séquelles à long terme (pouvant toucher jusqu'à 1 survivant sur 3)
 - Perte d'acuité auditive
 - Troubles neurologiques
 - Amputation de doigts, d'orteils ou de membres

Même lorsque la maladie est diagnostiquée et traitée très tôt, de 5 à 10 % des malades décèdent, habituellement dans les 24 à 48 heures suivant l'apparition des symptômes.

Il existe plusieurs sérogroupes de la bactérie. Un vaccin antiméningococcique quadrivalent tel que Nimenrix peut contribuer à la protection contre 4 des 5 sérogroupes qui causent souvent la méningococcie invasive, soit A, C, W₁₃₅ et Y.

Qu'est-ce que Nimenrix?

Nimenrix est un vaccin qui aide à prévenir les infections causées par les bactéries *Neisseria meningitidis* de types A, C, W₁₃₅ et Y.

Comment agit-il?

Le vaccin agit en stimulant la production d'anticorps dirigés contre les bactéries. Il ne peut pas causer de maladies liées à ces bactéries.

Comment l'administre-t-on?

Nimenrix sera injecté par un professionnel de la santé dans un muscle du haut du bras ou de la cuisse en une seule dose de 0,5 mL*.

Même si vous avez déjà été vacciné, demandez à votre médecin de vérifier si vous êtes protégé contre les 4 sérogroupes (A, C, W₁₃₅ et Y).

Demandez à votre médecin quels vaccins sont requis dans votre province de résidence.

* Schéma posologique pour les personnes âgées de 12 mois à 55 ans

Comment l'infection se transmet-elle?

La méningite méningococcique se transmet par contact direct étroit entre deux personnes, entre autres des façons suivantes :



baisers



toux et éternuements



aliments et ustensiles



boissons



baume pour les lèvres



cigarettes

Jusqu'à 10 % des gens peuvent être porteurs de la bactérie qui cause la méningite méningococcique.

Il est possible de prévenir la **MÉNINGITE** **MÉNINGOCOCCIQUE**

Demandez à votre médecin de vous parler de la vaccination par **Nimenrix**



Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent causer des problèmes graves, comme une réaction allergique sévère. Le risque que Nimenrix cause des problèmes graves est extrêmement faible. Par ailleurs, ce risque est beaucoup plus faible que le risque lié au fait de contracter une infection à méningocoque. Chez les nourrissons, les adolescents et les adultes, les effets indésirables très courants (plus d'une dose du vaccin sur 10) suivant la vaccination par Nimenrix ont été la perte de l'appétit, l'irritabilité, la somnolence, les maux de tête, la fièvre, l'enflure, la douleur et la rougeur au point d'injection et la fatigue. Les effets courants (dans plus d'une dose sur 100) suivant la vaccination par Nimenrix ont été des symptômes gastro-intestinaux y compris la diarrhée, les nausées, les vomissements et un hématome au point d'injection. Communiquez avec votre professionnel de la santé dès que possible si vous ou votre enfant ne vous sentez pas bien après avoir reçu Nimenrix. Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Si Nimenrix cause un effet inattendu, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.

Consultez la monographie au www.pfizer.ca/pm/fr/Nimenrix.pdf pour obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui n'ont pas été mentionnés dans le présent document. Vous pouvez également vous procurer la monographie en composant le **1-800-463-6001**.

DIN : 02402904



Nimenrix^{MD} 

Nimenrix, M.D. de GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Pfizer inc., licencié
© 2020 Pfizer Canada SRI, Kirkland (Québec) H9J 2M5

PP-NIM-CAN-0018-FR